

TSAROS

Προϊόν παράλληλου εμπορίου (προϊόν αναφοράς: ΤΕΡΡΕΚΙ 50 WG)
flonicamid 50% β/β
Εναιωρηματοποιησιμο κόκκοι (WG)

Διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων. Η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Πολύ σημαντικό όπλο των παραγωγών κατά των αφίδων, μετά τον περιορισμό χρήσης των νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων.

Ευρύ φάσμα δράσης (δενδρώδεις, κηπευτικές και εκτατικές καλλιέργειες, βλ. ετικέτα).

Δεν απαιτείται η τήρηση χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς/φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας ή σποράς/φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν.

Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκαστεί με το σκεύασμα είναι δυνατή χωρίς κίνδυνο, 6 ώρες μετά την εφαρμογή στον αγρό και 8 ώρες μετά την εφαρμογή στο θερμοκήπιο.

Σύμφωνα με την έγκρισή του δεν έχει σήμανση τοξικότητας για τον άνθρωπο, οπότε δεν απαγορεύεται η χρήση του σε κατοικημένες περιοχές.

Μικρή ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα (5 μέτρα).

Μόλις μία (1) ημέρα τελευταία ασφαλή επέμβαση πριν τη συγκομιδή σε Αγγούρια – Αγγουράκια, Κολοκυθάκια θερμοκηπίου, Τομάτες-μελιτζάνες (αγρού και θερμοκηπίου).

Συσκευασίες:

1. Σακούλες / βαζάκια 10 γρ. - 2 κιλά. Βαζάκια τυπωμένα HDPE ή σακούλκια HDPE κλεισμένα αεροστεγώς που περιέχονται μέσα σε κουτί. COEX (HDPE/PA).
2. Σάκοι 25 κιλά. HDPE.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



25

11/2024



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

TSAROS

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες):

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιές, Μανταρινιές, Λεμονιές, Γκρέιπ-φρουτ, Κιτριά, Φράπες, Νερατζιές, Περγαμόντο): Για Αφίδες Εσπεριδοειδών με 3.5-10 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 10 γρ. σε 100-300 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιές, Κερασιές, Δαμασκηγιές): Για Αφίδες με 8-14 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 14 γρ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾.

Μηλοειδή: Μηλιές (για κνίριζα και πράσινη αφίδα), **Αχλαδιές, Αχλαδιές-NASHI, Κυδωνιές** (για αφίδες και κνίριζα αφίδα της Αχλαδιάς) με 8-14 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 14 γρ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾.

Σολανώδη (Τομάτες-Μελιτζάνες υπαίθρου): Για Αφίδες με 10 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾.

Σολανώδη (Τομάτες-Μελιτζάνες θερμοκηπίου): Για Αφίδες με 10 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 3 εφαρμογές max (1 φυλλώματος, 2 με στάγδην άρδευση) ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται, με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾ (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα).

Σολανώδη (Τομάτες-Μελιτζάνες θερμοκηπίου εφαρμογές με στάγδην άρδευση): Για Αλευρώδεις με 16 γρ. σε 200-500 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 3 εφαρμογές max (1 φυλλώματος, 2 με στάγδην άρδευση) ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα φύλλα ενάντια στις αφίδες. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός εφαρμογών είναι max 3 με δύο επεμβάσεις στάγδην άρδευση και μία φυλλώματος.

Κολοκυνθοειδή (Αγγούρια-Αγγουράκια-Κολοκυθάκια θερμοκηπίου): Για Αφίδες με 10 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾ (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα).

Σιτάρι: Για Αφίδες με 14 γρ. σε 20-50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. **Καπνός:** Για Αφίδες, Θρίπες (Χρήση ήσσονος σημασίας) με 14 γρ. σε 40-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών.

Καπνός* (εφαρμογή με ριζοπότισμα με το νερό της μεταφύτευσης): Για Αφίδες, Θρίπες (Χρήση ήσσονος σημασίας) με 14 γρ. σε 40-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 2 εφαρμογές max (1 εφαρμογή με ριζοπότισμα με το νερό της μεταφύτευσης και 1 εφαρμογή φυλλώματος μετά από 14 ημέρες) εφόσον απαιτείται κατά τη μεταφύτευση χωρίς την παρουσία μελισσών.

Βαμβάκι: Για Αφίδες, Λύγκο* (Χρήση ήσσονος σημασίας) με 7.5 γρ. σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾.

Αρακάς (με λοβό) υπαίθρου (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Για Αφίδες

με 35-70 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 14 γρ. σε 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του 6^{ου} ξεδιπλωμένου φύλλου (BBCH 16) χωρίς την παρουσία μελισσών.

Καλλωπιστικά φυτά (Τριανταφυλλίες υπαίθρου και θερμοκηπίου): Για Αφίδες με 14 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών – εντόμων⁽¹⁾ (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα).

Καλλωπιστικά δέντρα και Καλλωπιστικοί θάμνοι: Για Αφίδες με 14 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών.

Μαρούλι, Σκαρόλες (πικρίδα)/Πλατύφυλλα, Αντίδια, Ρόκα, Λυκοτρίβολο, Γαιοκάρδαμο, Κόκκινο σινάπι: Για Αφίδες με 2 mg σκ./φυτό (αντιστοιχεί σε 14 γρ. σκ./στρ.). 1 εφαρμογή με εμβάπτιση/διαβροχή του δίσκου σποράς πριν την μεταφύτευση των νεαρών φυταρίων, από την ανάπτυξη του 1^{ου} φύλλου έως 6^{ου} φύλλου νωρίς την άνοιξη μέχρι το τέλος του φθινοπώρου (BBCH 11-16).

Μπιζέλια με λοβό, Φασόλια με λοβό: Για Αφίδες με 14 γρ. σε 20-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του πρώτου πραγματικού φύλλου έως όταν το 10% των λοβών φτάσει το τυπικό μήκος του καρπού (την Άνοιξη, από Απρίλιο έως Οκτώβριο (BBCH 11-71).

Όσπρια (Μπιζέλια, Φασόλια): Για Αφίδες με 14 γρ. σε 20-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του πρώτου πραγματικού φύλλου έως όταν το 10% των λοβών φτάσει το τυπικό μήκος του καρπού (την Άνοιξη, από Μάρτιο έως Οκτώβριο (BBCH 11-71).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. **2)** Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης. **3)** Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών. **4)** Η εφαρμογή με εμβάπτιση/διαβροχή των δίσκων μηχανικά, με στάγδην άρδευση, πριν την μεταφύτευση να γίνεται 1 μέρα (μέγιστο) πριν την καθορισμένη ημερομηνία μεταφύτευσης. Η δόση η οποία θα εφαρμοστεί να μην ξεπερνά τα 2 mg σκευάσματος/φυτό. *Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας του Βαμβακιού και του Καπνού, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. **Για τη χρήση ήσσονος σημασίας του Αρακά (με λοβό), δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.



26

11/2024



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —