



Πυκνό διάλυμα (SL)

Δραστική ουσία: Flupyradifurone 20% β/ο

NEO

# ARBOL

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Flupyradifurone (Φλουπυραντιφουρόν)

## Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων (Αφίδες, Αλευρώδεις, Τζιτζικακία, Οπλοκάμπη, Φυλλοξήρα, Ψευδόκοκκο Κοκκοειδή) σε υπαιθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Το flupyradifurone είναι ένα νέο εντομοκτόνο που ανήκει στη νέα χημική ομάδα butenolides (IRAC Group 4D). Έχει διασυστηματική ακροπέταλη κίνηση μέσω των αγγείων του ξυλώδους και ταυτόχρονα κινείται γρήγορα διελασματικά στο φύλλωμα. Παρουσιάζει ταχύτατη αρχική δράση (knock-down effect) η οποία οδηγεί σε άμεση διακοπή της απομύζησης χυμών από τα έντομα, με αποτέλεσμα να συμβάλει στην πρόληψη μετάδοσης και εξάπλωσης των ιώσεων ιδιαίτερα από τους αλευρώδεις. Το σκεύασμα έχει δράση στα διάφορα στάδια του βιολογικού κύκλου των εντόμων (προνύμφες, νύμφες, ακμαία). Χαρακτηρίζεται από σταθερότητα στην έκπλυση από βροχή (μετά από 2 ώρες βροχόπτωσης).



**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Στην καλλιέργεια του μαρουλιού (Y) να μην χρησιμοποιείται σε εδάφη με τεχνητή στράγγιση. Το σκεύασμα να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μυκητοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στη χημική ομάδα των παρεμποδιστών βιοσύνθεσης εργοστερόλης κατά την περίοδο της άνθησης όταν οι μέλισσες επισκέπτονται τα άνθη. Μη χρησιμοποιείτε ως ζωτροφία χοίρων τα καρότα, τα ξερά φασόλια, τα ξερά κουκιά και τα υποπροϊόντα των εσπεριδοειδών που προέρχονται από καλλιέργειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική flupyradifurone, η οποία ανήκει στην ομάδα 4 κατά IRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Πιθανώς να προκαλέσει παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας στην καλλιέργεια του αγγουριού. Δεν είναι φυτοτοξικό στις υπόλοιπες εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό/βυτίο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνδυαστικότητα: --, Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (ημέρες):** Πορτοκαλιά-Νεραντζιά-Γκρέιπφρουτ-Φράπα: 30. Βαμβάκι, Καρότο: 21. Αμπέλι επιτραπέζιο-οινοποίηση, Ελιά επιτραπέζια-ελαιοποίηση: 14. Μπιζέλι με λοβό (Y), Μπιζέλι χωρίς λοβό (Y), Μπιζέλι ξηρό (Y) 1 εφαρμογή κάθε χρόνο: 7. Μπιζέλι με λοβό (Y), Μπιζέλι χωρίς λοβό (Y), Μπιζέλι ξηρό (Y) 1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής (BVCH 12-19). Φασόλι με λοβό (Y)-Κουκί με λοβό (Y)-Οστρία Φασόλι-Κουκί 1 εφαρμογή κάθε χρόνο: 7. Φασόλι χωρίς λοβό (Y)-Κουκί χωρίς λοβό (Y) 1 εφαρμογή κάθε χρόνο: 3. Φασόλι με λοβό (Y)-Κουκί με λοβό (Y)-Φασόλι χωρίς λοβό (Y)-Κουκί χωρίς λοβό (Y)-Οστρία Φασόλι-Κουκί 1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής. Τομάτα (Y/Θ), Πιπεριά (Y/Θ), Μελιτζάνα (Y/Θ), Αγγούρι (Y/Θ), Κολοκύθι (Y/Θ), Κολοκύθα (Y/Θ), Καρπούζι (Y/Θ), Μαρούλι (Y), Φράουλα (Θ), Σμέουρο/Κόκκινο Βατόμουρο (Θ), Μαύρο Βατόμουρο (Θ): 3. Καπνός, Καλλιπαστικά (Θ): Μη εφαρμόζεται από το χρόνο εφαρμογής. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, χωρίς να εκτίθεται απευθείας στο φως.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΩΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
• Μην φάτε ή πίνετε (αλλεργική αντίδραση) αν έχετε έρθει σε επαφή με το προϊόν.  
• Ίσως να είναι επικίνδυνο για τα ζώα.  
• Προστατέψτε τα παιδιά και τα ζώα.  
• Μην πελάτε το προϊόν στο νερό.  
• Μην πελάτε το προϊόν στο έδαφος.  
• Μην πελάτε το προϊόν στο νερό.  
• Μην πελάτε το προϊόν στο έδαφος.  
• Μην πελάτε το προϊόν στο νερό.  
• Μην πελάτε το προϊόν στο έδαφος.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:**  
10cc / 150cc / 250cc / 500cc / 1LT



5

05/2024

[www.nitrofarm.gr](http://www.nitrofarm.gr)

[info@nitrofarm.gr](mailto:info@nitrofarm.gr)

Free-phone: 800 11 820 820  
+30 2310 553354-7,

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,  
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

# NitroFarm

— από το 1976 —

# ARBOL

## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ


### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ

**ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΕΛΙΑ:** (επιτραπέζιες & ελαιοποιήσιμες ποικιλίες): Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο της πλήρης έκπτυξης των ανθοταξιών μέχρι πριν από την πλήρη ωρίμανση των καρπών (το χρώμα των καρπών έχει σχεδόν αλλάξει) (BBCH 55-85). Ειδικά για τον δάκο, ο ψεκασμός να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες παρακολούθησης του δακοπληθυσμού. Δάκος, Λεκάνιο δόση 75 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 80-100 λίτρα/στρέμμα. 1 εφαρμογή τον χρόνο.

**ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:** (Πορτοκαλιά, Γκρέιπφρουτ, Φράππα, Νερατζιά): Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των καρπών (BBCH 69-75). Αφίδες δόση 75 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 120-150 λίτρα/στρέμμα. 1 εφαρμογή τον χρόνο. **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:** (Πορτοκαλιά): Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των καρπών (BBCH 69-75). Χρήσεις ήσσονος σημασίας (Κοκκοειδή-Ψύλλα των εσπεριδοειδών-Μαύρος ακανθώδης αλευρώδης\*) δόση 75 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 120-150 λίτρα/στρέμμα. 1 εφαρμογή τον χρόνο. **ΑΜΠΕΛΙ:** Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής όταν οι ταξιανθίες είναι πλήρως αναπτυγμένες, ως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 57-81). Κοκκοειδή, Αφίδες, Φυλλοξήρα, Ψευδόκοκκος δόση 50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Τζιτζικακία δόση α) 20 κ.εκ./στρέμμα για ύψος κόμης 80 εκ. β) 25 κ.εκ./στρέμμα για ύψος κόμης 100 εκ. γ) 30 κ.ε.κ./στρέμμα για ύψος κόμης 120 εκ. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 1. **ΣΟΛΑΝΩΔΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Υ): ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ:** Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89). Αφίδες δόση 45 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 45-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 1. **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Υ): ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ:** Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89). Αφίδες δόση 56 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 45-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 1. **ΜΑΡΟΥΛΙ (Υ):** Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το 10% της ανάπτυξης της φυλλικής επιφάνειας μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του προς κατανάλωση μέρους του φυτού (BBCH 41-49). Αφίδες δόση 62,5 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 1. **ΜΠΙΖΕΛΙΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΟΒΟ (Υ), ΜΠΙΖΕΛΙΑ ΞΗΡΑ (Υ):** Αφίδες δόση 37,5 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι τον σχηματισμό των 9 πρώτων φύλλων και ελίκων. (BBCH 12-19) με 1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια, ή Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη επιμήκυνσης του βλαστού μέχρι την ωρίμανση του 70% των λοβών (BBCH 30-87) με 1 εφαρμογή τον χρόνο. **Φασόλι χλωρό με ή χωρίς λοβό (Υ), Κουκί χλωρό με ή χωρίς λοβό (Υ), ΟΣΠΡΙΑ Φασόλι (Υ), Κουκί (Υ):** Αφίδες δόση 37,5 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-75 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των λοβών (BBCH 69-75) με 1 εφαρμογή τον χρόνο ή Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής προσβολής κατά το στάδιο ανάπτυξης των πλευρικών βλαστών (BBCH 21-29) με 1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια. **ΚΑΠΝΟΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του

δεύτερου πραγματικού, φύλλου μέχρι τα συγκομισίμα φύλλα φτάσουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 12-49). Αφίδες δόση 50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 1. **BAMBAKI:** Αφίδες, Τζιτζικακία\* (Χρήση ήσσονος σημασίας), ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την έναρξη αποξήρανσης του φυλλώματος (BBCH 12-90). Δόση 37,5κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-60 λίτρα/στρέμμα. 1 εφαρμογή τον χρόνο. **ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΒΟΛΩΔΗ (Θ):** Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων (από BBCH 11). Αφίδες δόση 50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 4/7. **ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Θ): ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ, ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ:** Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων (από BBCH 11). Αφίδες δόση 50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. Αλευρώδεις δόση 75 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού, 50-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 4/7. **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ): ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ): ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ:** Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89). Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ. Όγκος ψεκ. υγρού: 75 λίτρα/στρέμμα ανά 100 εκ. ύψους φυτού. Αφίδες δόση 45 κ.εκ./στρέμμα ανά ύψος φυτού 100 εκ. (60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Αφίδες, Αλευρώδεις δόση 56 κ.εκ./στρέμμα ανά ύψος φυτού 100 εκ. (75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 2/10. **ΦΡΑΟΥΛΑ (Θ):** Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του πεμππου (5ου) πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 15-89). Όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/στρέμμα. Αφίδες δόση 50 κ.εκ./στρέμμα. Αλευρώδεις δόση 62,5 κ.εκ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 2/10. **ΣΜΕΟΥΡΟ/ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ (Θ) (RASPBERRY, ΜΑΥΡΟ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ (Θ) (BLACKBERRY):** Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του πέμππου (5ου) πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 15-89). Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ. Αφίδες δόση α) 50 κ.εκ./στρέμμα για ύψος κόμης 100 εκ. (100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) με όγκο ψεκ. υγρού 50 λίτρα/στρέμμα. β) 100 κ.εκ./στρέμμα για ύψος κόμης 200 εκ. (100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 2/10. **ΚΑΡΟΤΟ:** Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής το στάδιο του 9<sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εδώδιμου μέρους του φυτού (BBCH 19-49). Χρήση ήσσονος σημασίας (Ψύλλα του καρότου) δόση 37,5 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 30-80 λίτρα/στρέμμα. 1 εφαρμογή τον χρόνο.

**Παρατηρήσεις:** -Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα. \*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στα τζιτζικακία στο βαμβάκι και τον μαύρο ακανθώδη αλευρώδη στην πορτοκαλιά. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».



6

05/2024



[www.nitrofarm.gr](http://www.nitrofarm.gr)



[info@nitrofarm.gr](mailto:info@nitrofarm.gr)



Free-phone: 800 11 820 820  
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,  
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

**NitroFarm**

— από το 1976 —