Propamocarb hydrochloride (Προπαμοκάρμπ υδροχλοράιντ) 72,2 % β/ο
Πυκνό διάλυμα (SL) ● Χημική ομάδα: Καρβαμιδικά

NEO

PRECISE

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.
Το propamocarb hydrochloride παρουσιάζει μικρή διασυστηματική κίνηση. Απορροφάτε από τις ρίζες και μεταφέρεται προς τα φύλλα και έχει υπολειμματική δράση 3-8 εβδομάδες. Επηρεάζει το σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών με συνέπεια την παρεμπόδιση της μυκηλιακής ανάπτυξης καθώς και της παραγωγής και βλάστησης των σπορίων των παθογόνων μυκήτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:
100cc / 500cc / 1LT / 5LT

Φάσμα Δράσης:
Πεδίο Εφαρμογής: Φυτώρια/Σπορεία: Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ), Πεπόνι (Θ), Μαρούλι (Θ), Καλλωπιστικά (Θ).
Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Μελιτζάνα* (Θ), Κολοκύθι* (Θ), Καρπούζι *(Θ).
Στόχος: Πύθιο (*Pythium sp.*)
Δόσεις σκευάσματος: 50-100 κ.εκ. σκ./100 λίτρα νερού ή 3 κ.εκ. σκ. σε 3-6 λίτρα διαλύματος/τετραγ. μέτρο.
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογή με πότισμα πριν ή αμέσως μετά την σπορά (BBCH 00-09).
Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά έτος: 1 εφαρμογή για τις καλλιέργειες του παρόντος φάσματος δράσης.
Παρατηρήσεις: *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Οι μεταφυτεύσεις να πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του μήνα Μαρτίου και η εφαρμογή του σκευάσματος να προηγείται είκοσι οκτώ (28) ημέρες πριν την μεταφύτευση.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία Propamocarb που ανήκει στην ομάδα F4 κατά FRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητα.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενη δόση.
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογή με πότισμα στα σπορεία.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιείται την ημέρα παρασκευής του.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε προσεκτικά τον εξοπλισμό εφαρμογής. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του προϊόντος.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο δοχείο εφαρμογής) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: --.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ), Μαρούλι (Θ), Καλλωπιστικά (Θ): Δεν ορίζεται. Καλύπτεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από την άμεση έκθεση στον ηλιακό φως.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

www.nitrofarm.gr
info@nitrofarm.gr
Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20, Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη
NitroFarm
— από το 1976 —