

# BRONTES

## 2,5 EC

**Deltamethrin (Ντελταμεθρίν) 2,5 %  
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)  
Χημική ομάδα: Πυρεθρινοειδών**

### Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων

**NEO**



**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτουγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας:** 1. Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. 2. Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. 3. Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται τις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. 4. Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές του προϊόντος. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. 5. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών-στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 6. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) -σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια. Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού δοχείου, δύο (2) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστράφηκαν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποθεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυσαστικότητα: --**

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (ημέρες):** Φρούλα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Μαρούλι, Ρόκα, Αγκινάρα: 3. Αμπέλι, Ελιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Λάχανο, Κουρουπίδι, Μπρόκολο, Φύλλα σέλινου, Μαιντανός, Φασόλια, Κουκιά, Φακές, Ρεβίθια, Μπιζέλια-Αρακάς, Πατάτα, Καπνός: 7. Μηδική: 14. Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ, Νεραντζιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, -Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Βαμβάκι, Ζαχαρότευπλο, Παντζάρι, Αραβόσιτος, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: 30.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Διατηρείστε το στην αρχική, απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

**ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.**

**ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.**

**Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015**

17

07/2024



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820  
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,  
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

# NitroFarm

— από το 1976 —

# BRONTEΣ 2,5 EC

## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Πυρεθροειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

**Πεδίο εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):**

**Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ, Νερατζιά):** i) Αφίδες με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Λεκάνιο, Μύγα της Μεσογείου με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση των προβολών.

**Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά):** i) Αφίδες με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 42-50 κ.εκ. σκευ. σε 140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Καρπόκαφα Καρυδιάς, Καρπόκαφα Καστανιάς με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 42-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών. iii) Ευρύτομο με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την έναρξη των πτήσεων των ακμαιών.

**Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά):** i) Καρπόκαφα, Αφίδες, Ψύλλα μηλιάς με 30-50\* κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλοδέτες με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-50 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Ψύλλα αχλαδιάς με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. Μέχρι 2 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά):** i) Φυλλοδέτες, Ανάρσια με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-49 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Ραγολέτιδα με 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Μύγα της μεσογείου με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Αφίδες, Καρπόκαφα της Δαμασκηλιάς με 35-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση των προβολών.

**Αμπέλι\*\*:** i) Ευδεμίδα με 50 κ.εκ. σκευ. (1η γενιά) & 50-70 κ.εκ. σκευ. (2η και 3η γενιά)/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοχλιίδα με 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Τζιτζικάκι, με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**Ελιά:** i) Πυρηνοτρίτης (ανθοβίας και καρπόβιας γενιά) με 30-40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40 κ.εκ. σκευ. σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή κατά την περίοδο της ανθοφορίας. ii) Δάκος με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαιών στις παγίδες. iii) Λεκάνιο με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. iv) Βαμβακάδα με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής.

**Φράουλα (υπαίθρου):** Αφίδες, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**Φράουλα (θερμοκηπίου):** Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο:** Κοφτοσκούληκα, Θρίπας με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 40-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**Τομάτα (Υπαίθρου και θερμοκηπίου), Μελιτζάνα (Υπαίθρου και θερμοκηπίου):** i) Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Άλτης, Μαμέστρα, Κοφτοσκούληκα, Σποντόπτερα με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών. ii) Δορυφόρος με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Βρωμύοσα με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 18-30 κ.εκ. σκευ. σε 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**Πιπεριά (Υπαίθρου και θερμοκηπίου):** i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 30-70 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Βρωμύοσα με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 18-30 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 18-42 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Αλευρώδης με 70 (Θ) κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 42-70 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Κοφτοσκούληκα με 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκασμοί ανά 14 ημέρες (Υ) και μέχρι 4 ψεκασμοί ανά 7 ημέρες (Θ) με την εμφάνιση των

προβολών.

**Κολοκυθάκι (υπαίθρου και θερμοκηπίου - Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Μαμέστρα, Σποντόπτερα), Αγγούρι, Αγγουράκι (υπαίθρου & θερμοκηπίου - Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα), Πεπόνι (υπαίθρου & θερμοκηπίου - Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Μαμέστρα, Κοφτοσκούληκα), Καρπούζι (υπαίθρου & θερμοκηπίου - Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Μαμέστρα), Κουνουπίδι, Μπρόκολο - Αφίδες, Πιριδά, Κοφτοσκούληκα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Πλουτέλλα με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.**

**Λάχανο (εκτός από το κινέζικο):** i) Πιριδά, Μαμέστρα, Πλούζια, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Πλουτέλλα με 50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**Μαρούλι (Υπαίθρου):** i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Άλτης, Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκασμούς ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**Μαϊντανός, Φύλλα Σέλινου, Ρόκα:** i) Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμέστρα, Άλτης με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**Μπιζελία (αρακάς) φρέσκα:** i) Αφίδα των μπιζελιών, Σπίτονα με 25 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αφίδα των κουκιών, Κάμπια των μπιζελιών, Θρίπας, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**Αγκινάρα:** i) Κασσίδα με 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Προντένια, Αφίδες με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκασμούς ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**Ψυχανθή (δόσπρια) Φασόλια - Κουκιά - Φακή - Ρεβίθια:** Πράσινο σκουλήκι, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**Πατάτα:** i) Δορυφόρος με 50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Σποντόπτερα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**Βαμβάκι:** i) Ρόδινο σκουλήκι, Πράσινο σκουλήκι με 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αλευρώδης, Τζιτζικάκι με 50 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Σποντόπτερα, Αφίδα, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής.

**Καπνός:** Κοφτοσκούληκα, Θρίπας με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκασμούς ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι:** i) Αφίδες, Μύγα των τεύτλων, Άλτης, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κασσίδα με 50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση των προβολών.

**Αραβόσιτος\*\*\*:** i) Πυραλίδα, Σεζάμια, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκασμούς ανά 14-21 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών. ii) Διαβρωτικά με 50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Για την Διαβρωτικά μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες.

**Σιπρά (Σάπρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη):** Αφίδες, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 40-60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση των προβολών.

**Μηδική:** Αφίδα των μπιζελιών, Σκαθάρι των μπιζελιών, Φυτονόμος με 25 κ.εκ. σκευ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**Καλωπιτικά (Υπαίθρου και θερμοκηπίου):** i) Αφίδες, Θρίπες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλοδέτες με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 17,5-35 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Αλευρώδης με 70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκασμούς ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση των προβολών.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** \*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/ηλί πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 l/στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα. \*\*Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν. \*\*\*Η εφαρμογή στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia spp.* και *Sesamia spp.*



18

07/2024



[www.nitrofarm.gr](http://www.nitrofarm.gr)



[info@nitrofarm.gr](mailto:info@nitrofarm.gr)



Free-phone: 800 11 820 820  
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,  
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

**NitroFarm**

— από το 1976 —