

Paraffin oil
(Παραφίν όιλ) 83 % βιο
Γαλακτωματοποίηση υγρό (EC)

ΒΙΝΑΔΟ

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση
σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.

Φάσμα δράσης:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά), ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηλιά), ΕΛΙΑ* ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ*, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ*, ΚΑΡΥΔΙΑ*, ΦΙΣΤΙΚΙΑ*.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.

Συνδυαστικότητα: ---.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά (24 ώρες).

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Για όλες τις καλλιέργειες, καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία > 0°C. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100ml / 200ml / 500ml / 1LT / 5LT / 10LT / 20LT

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. ΕΚ 843/2018 & 1165/2021



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

ΒΙΒΑΔΟ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Χρόνος εφαρμογής:
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά): i) Κόκκινη ψώρα, Παρλατόρια και άλλες ψώρες με 1000-1500 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 1000-2240 κ.εκ. σε 100-220 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH 00-81). ii) Αλευρώδεις με 1000-1500 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500-2240 κ.εκ. σε 50-220 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH 00-81) ή μία φθινοπωρινή.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά): i) Ψώρα Σαν-Ζοζέ και άλλες ψώρες με 750-1000 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 600-1000 κ.εκ. σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH 00-81). ii) Κόκκινος τετράνυχος με 750-1000 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 940-1500 κ.εκ. σε 125-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Εφαρμογή πριν την άνθηση (BBCH 54-56).

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηλιά): i) Ψώρα Σαν-Ζοζέ και άλλες ψώρες με 750-1000 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 600-1000 κ.εκ. σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH 00-81). ii) Κόκκινος και Κίτρινος τετράνυχος με 750-1000 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 940-1250 κ.εκ. σε 125 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Εφαρμογή πριν την άνθηση (BBCH 51-53).

Ελιά (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας)*: Παρλατόρια, Λεκάνιο, Πολλίνια, Άσπρη ψώρα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Ψώρες, Ακάρεα (*Eriophyes vitis**, *Tegolophus hassani**, *Oxycenus maxwelli**, *Eotetranychus carpini**) με 750-1000 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 600-1500 κ.εκ. σε 80-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων ως μικρούς καρπούς (BBCH 67-79).

Ακτινιδιά (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)*: Ψώρα Σαν Ζοζέ, Βαμβακάδα ή Διάσπης, Μετκάφα, Βαμβακάδα, Κίτρινος Τετράνυχος, Κόκκινος Τετράνυχος με 750-1000 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 600-1500 κ.εκ. σε 80-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση και μετά τη συγκομιδή (BBCH 50-90).

Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας)*: Κοκκοειδή, Ψώρα Σαν Ζοζέ, Βαμβακάδα ή

Διάσπης, Μυτιλόμορφη ψώρα, Κόκκινη ψώρα κ.α. ψώρες *Sphaerolecanium prunastri*, *Eulecanium persicae*, *Melanaspis inopinata*, Κίτρινος τετράνυχος με 750-1000 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 600-1500 κ.εκ. σε 80-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την ροζ κορυφή και μετά τη συγκομιδή. (BBCH 57-69 και BBCH 99).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά): 1-2/>60, ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηλιά), Ελιά, Ακτινιδιά: 1. Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά: 2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής. 2. Στα εσπεριδοειδή η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να συνδυαστεί με το κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαστεί η μέγιστη δόση/στρ. 3. Κατά τη χρήση του **ΒΙΒΑΔΟ** τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. 4. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι στρεσαρισμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός. 5. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα, την περίοδο της ανθοφορίας ή όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας. 6. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου. 7. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευασμάτων με δ.ο. captan, folpet και dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ελιάς, ακτινιδιάς, αμυγδαλιάς, καρυδιάς και φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».



42

07/2024



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —